

NOMENCLATURE DE DEUX ESPÈCES DE LOBELIA L.

des PETITES ANTILLES

Par CLAUDE SASTRE

Comme suite à ma dernière publication sur la reconnaissance des divers taxons spécifiques et infrasécifiques des *Lobelia* L. des Petites Antilles (C.R. Acad. Sci. Paris sér. 3. 4: 161-164, t. 300. 1985) j'apporte des éclaircissements sur la nomenclature de deux espèces: L. stricta Swartz et L. areolata Richard ex Jussieu

1. Lobelia stricta Swartz, Prodrômus 117. 1788.

SWARTZ indique qu'il a décrit cette espèce sur un spécimen: "India occidentalis, Guadeloupe". Il faut attendre 1806 (Fl. Indiae Occidentalis 3: 1952) pour qu'il donne plus de précision sur l'origine de ce spécimen: "In regione muscosa montis La Soufriere Guadeloupe insulae legit de PONTHEIU".

Dans l'herbier de Swartz déposé à Sockholm existe un spécimen: "Guadeloupe, leg. De Ponthieu" correspondant bien à la description de L. stricta Sw.

Le spécimen déposé au British Museum sous le même nom, récolté aussi par De Ponthieu: "In regione muscosa montis La Soufriere copiosae" n'appartient pas à cette espèce mais à L. areolata Rich. ex Juss.

Il est fort probable que des collections d'origine diverse ont été regroupées et leurs étiquettes portent le nom d'une même localité, ce qui a conduit à des erreurs de nomenclature. L. stricta est connue de St. Kitts-Nevis et L. areolata de Guadeloupe, Dominique et Martinique.

Lectotypification

L'espèce de Swartz étant valablement décrite, le spécimen authentique existant, j'établis l'holotype sur le spécimen "Guadeloupe, leg. de Ponthieu" 5, bien que ce spécimen soit sûrement originaire de St. Kitts (anciennement Saint Christophe dont une partie était française au 17<sup>e</sup> siècle).

2. Lobelia areolata Richard ex Jussieu, Ann. Hist. Nat. 18: 3- 4. 1811.

Espèce décrite sur un spécimen envoyé par A. Richard à A.-L. Jussieu pour compléter l'étude de ce dernier sur les Lobéliacées et les Stylidiées.

Syn. Tylomium flavescens Presl, Prodr. Monogr. Lobel. 32. 1836 nomen!

Tupa flavescens Candolle, Prodr. 7: 395. 1839; Duss, Fl. Phanér. Antil. Fr. 377. 1897. Type: Martinique, leg. Sieber (sous le nom de Lobelia conglobata Lam.) Holotype W, Isotype P.

Lobelia flavescens (DC.) Wimmer, Pflanzenreich 276 b : 626. 1957; Fournet, Fl. Ill. Phanér. Guadel. Martin. 598. 1978.

Tupa stricta auct. (Urban, McVaugh) non Swartz

Lobelia cirsiifolia auct. (Duss, Fournet) non De Candolle

Lobelia infesta auct. (Fournet) non (Grisebach) Urban

#### Typification

Le binôme de Jussieu étant valablement décrit, le spécimen type bien défini et existant, est l'holotype : "Guadeloupe, Soufrière, leg. Richard" JUSS-P.

Muséum National d'Histoire Naturelle,  
PARIS.